



NOTA TÉCNICA N. 002/2022-VS/SMS

1. ASSUNTO

Modificação do Esquema Vacinal – Vacinação contra Covid 19
Alteração da Dose Adicional (D3) e inserção da dose de Reforço (D4).

2. ANÁLISE

O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação (PNO) contra a Covid 19 é dinâmico, evolutivo e adaptável à evolução do conhecimento científico, à situação epidemiológica e à disponibilidade das vacinas contra a Covid 19 no Brasil.

Desta forma, o mesmo documento modifica o esquema vacinal dos indivíduos acima de 18 anos considerados como imunocomprometidos para acrescentar a 4ª dose ou dose de reforço, a partir de evidências que comprovam essa real necessidade de acordo com a nota técnica de nº65/2021 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS (ANEXO 01) e inclui o público de 12 a 18 anos sob diretrizes semelhantes conforme nota técnica de nº08/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.

É importante salientar que de acordo com a 12ª edição do PNO, entende-se por imunocomprometidos ou pessoas com alto grau de imunossupressão:

- I – Imunodeficiência primária grave;
- II – Quimioterapia para câncer;
- III – Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;
- IV – Pessoas vivendo com HIV/AIDS;
- V- Uso de corticóides em doses maior ou igual a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente acima de 14 dias;
- VI – Uso de drogas modificadoras da resposta imune;
- VII- Auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias;
- VIII – Pacientes em hemodiálise;
- IX – Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.



3. CONCLUSÃO

Assim sendo, e obedecendo aos critérios estabelecidos pelo PNO, da Nota Técnica de nº65/2021 – SEGOVID/GAB/SEGOVID, Nota técnica de nº8/2022 – SECOVID/GAB/SECOVID/MS e a Nota Informativa – 85ª versão da Secretaria de Estado de Saúde, a vacinação passa pela seguinte reestruturação:

Esquemas Vacinais COVID-19 – MG – Atualização 11/02/2022 – Secretaria de Estado – MG

1. Esquema Vacinal para todos os indivíduos acima de 18 anos, exceto gestantes e puérperas:

ACIMA DE 18 ANOS, NÃO GESTANTE OU PUÉRPERA			
Vacina contra a COVID-19	D2	Reforço	
		Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidose)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Astrazeneca	8 semanas após D1	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG Nº 3632.	4 meses após D2	Preferencialmente, da plataforma de RNA mensageiro (Comirnaty/Pfizer) ou, de maneira alternativa, vacina de vetor viral (Janssen ou AstraZeneca)
Janssen	NÃO se aplica	2 meses após D1	Janssen



2. Esquema Vacinal para todas as Gestantes e Puérperas acima de 18 anos:

ACIMA DE 18 ANOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS			
Vacina contra a COVID-19	D2	Reforço	
		Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidose)	4 semanas (28 dias) após D1	4 meses após D2	Comirnaty/Pfizer
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	4 meses após D2	Comirnaty/Pfizer

3. Esquema Vacinal de Adolescentes de 12 a 17 anos, não imunocomprometidos:

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	0,3 ml



4. Esquema Vacinal de Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos de Idade, não imunocomprometidas:

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS DE IDADE, NÃO IMUNOCOMPROMETIDAS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidose)	28 dias (4 semanas)	0,5 ml

5. Esquema Vacinal de Crianças de 05 a 11 anos de idade, não imunocomprometidas:

CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS		
Vacina contra a COVID-19	D2	Volume da dose
Comirnaty/Pfizer PEDIÁTRICA	8 semanas	0,2 ml



6. Esquema Vacinal para todos os indivíduos acima de 18 anos que são considerados como imunocomprometidos, exceto gestantes e puérperas.

ACIMA DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDO, NÃO GESTANTE OU PUÉRPERA					
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose adicional)		DR (Dose de Reforço)	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan – Coronavac (monodose e multidose)	4 semanas (28 dias) após D1	A partir de 8 semanas após D2	Sinovac/Butantan - Coronavac (monodose OU multidose) - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Astrazeneca	8 semanas após D1	A partir de 8 semanas após D2	Astrazeneca - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 – Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	A partir de 8 semanas após D2	Comirnaty/Pfizer - Mesmo imunizante do esquema primário.	4 meses após dose adicional ou D3	Comirnaty/Pfizer, Janssen ou AstraZeneca
Janssen					
Dose única	DR (Dose de Reforço)	Dose adicional	DR (Dose de Reforço)		
			Intervalo	Imunizante	
Janssen (Dose única - DU)	Dose de reforço (DR) 8 semanas após DU	Não recomendada	4 meses após dose adicional	4 meses após dose adicional	



7. Esquema Vacinal de Gestantes e Puérperas com idade acima de 18 anos imunocomprometidas.

ACIMA DE 18 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDOS, GESTANTES OU PUÉRPERAS					
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose adicional)		Reforço	
		Intervalo	Imunizante	Intervalo	Imunizante
Sinovac/Butantan - Coronavac (monodose e multidose)	4 semanas (28 dias) após D1	A partir de 8 semanas após D2	Sinovac/Butantan - Coronavac (monodose e multidose) - Mesmo imunizante do esquema primário.	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3	Preferencialmente Comirnaty/Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 - Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	A partir de 8 semanas após D2	Comirnaty/Pfizer - Mesmo imunizante do esquema primário.	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3	Preferencialmente Comirnaty/Pfizer, se não disponível utilizar Coronavac.

8. Esquema Vacinal de Adolescentes de 12 a 17 anos considerados como imunocomprometidos, incluindo gestantes e puérperas.

ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS, IMUNOCOMPROMETIDAS, INCLUINDO GESTANTES OU PUÉRPERAS IMUNOCOMPROMETIDAS			
Vacina contra a COVID-19	D2	D3 (Dose Adicional)	Dose de reforço
Comirnaty/Pfizer	3 semanas (21 dias) após D1 - Conforme Deliberação CIB-SUS-MG N° 3632.	8 semanas após D2	A partir de 4 meses após a dose adicional ou D3

PRISCILLA RAMOS DE QUEIROZ AMARAL
Referência Técnica Central de Vacinas

LARISSA BANDEIRA DE MELLO BARBOSA
Chefe do Departamento de Vigilância Epidemiológica

ANA MARIA DE OLIVEIRA BERNARDES
Diretora de Vigilância Em Saúde

SÉTIMO BÓSCOLO NETO
Secretário de Saúde